

Guía para conversar con el médico

ESPERE MÁS DE SU TRATAMIENTO PARA LA PSORIASIS EN PLACAS DE MODERADA A GRAVE

Responda las 4 preguntas a continuación y lleve esta guía a su próxima cita con el médico

1 ¿En qué parte de su cuerpo presenta las placas? Seleccione todas las opciones que le correspondan.

- ☐ Cuello
cabello ☐ Pecho/
estómago ☐ Espalda ☐ Brazos ☐ Manos ☐ Genitales ☐ Piernas ☐ Pies ☐ Otro

2 ¿Qué síntomas ha tenido o está teniendo actualmente? Seleccione todas las opciones que le correspondan.



Picazón

☐

Ardor

☐

Rigidez de la piel

☐

Dolor

☐

Escozor

☐

3 ¿Qué tratamientos ha utilizado para manejar los síntomas de la psoriasis en placas?

Seleccione todas las opciones que le correspondan.

- ☐ Cuidado personal
(baños, jabones) ☐ Tópicos de
venta libre,
como cremas ☐ Foto-
terapia ☐ Tratamientos para
la piel de venta
con receta médica,
como cremas ☐ Medicamentos
orales de venta
con receta
médica ☐ Inyecciones
de venta
con receta
médica

4 ¿Qué tan satisfecho(a) está con su tratamiento actual?



Actualmente
no estoy en
tratamiento

☐

Muy
insatisfecho(a)

☐

Insatisfecho(a)

☐

Indiferente

☐

Satisfecho(a)

☐

Totalmente
satisfecho(a)

☐

PREGUNTE A SU MÉDICO SOBRE

 **ICOTYDE™**
(icotrokinra) tablets



Un nuevo tipo de tratamiento en
una pastilla de una vez al día

Para adultos y niños de 12 años y mayores, que
pesan al menos 40 kg (88 libras), con psoriasis en
placas de moderada a grave

La pastilla no representa el tamaño real.

ICOTYDE™ 200 mg es un medicamento con receta que se utiliza para tratar la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos y niños de 12 años y mayores que pesen al menos 40 kg (88 libras) y que podrían beneficiarse del uso de inyecciones o medicamentos por vía oral (terapia sistémica) o de tratamiento con luz ultravioleta o UV (fototerapia).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

ICOTYDE™ no es para todos; solo su proveedor de atención médica puede decidir si es adecuado para usted. Es un medicamento con receta que puede causar efectos secundarios graves, incluidas infecciones. Puede aumentar el riesgo de padecer infecciones y reducir su capacidad de combatirlos. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una infección o tuberculosis (TB), o si necesita una vacuna. Lea la Información importante de seguridad en la [página 2](#) y la Guía del medicamento para obtener más información sobre estos y otros riesgos de ICOTYDE. Analice cualquier duda que tenga con su proveedor de atención médica.

INDICACIÓN

¿QUÉ ES ICOTYDE™ (icotrokinra)?

ICOTYDE™ 200 mg es un medicamento con receta que se utiliza para tratar la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos y niños de 12 años y mayores que pesen al menos 40 kg (88 libras) y que podrían beneficiarse del uso de inyecciones o medicamentos por vía oral (terapia sistémica) o de tratamiento con luz ultravioleta o UV (fototerapia).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ICOTYDE?

- **Infecciones.** Los medicamentos que interactúan con el sistema inmunitario, como ICOTYDE, pueden reducir su capacidad de combatir infecciones y aumentar el riesgo de padecerlas. Su proveedor de atención médica puede realizarle exámenes para detectar infecciones y tuberculosis (TB) antes de comenzar el tratamiento y es posible que deba tratar la TB antes de comenzar el tratamiento con ICOTYDE si usted tiene antecedentes de TB o TB activa. Su proveedor de atención médica deberá darle seguimiento de cerca para detectar la posible presencia de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con ICOTYDE y después de este.

Comuníquese de inmediato al proveedor de atención médica si presenta alguna infección o tiene síntomas de esta, entre los que se incluyen los siguientes:

- fiebre, sudoración o escalofríos
- tos
- dificultad para respirar
- mucosidad (esputo) con sangre
- dolores musculares
- calor, enrojecimiento o dolor en la piel o llagas en el cuerpo diferentes a las producidas por la psoriasis
- pérdida de peso
- diarrea o dolor de estómago
- ardor al orinar o micción con más frecuencia de lo normal

Antes de tomar ICOTYDE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus enfermedades, incluso en los siguientes casos:

- si padece una infección que no desaparece o siempre reaparece.
- si tiene tuberculosis (TB) o estuvo cerca de alguien que tiene TB.
- si recibió recientemente o tiene previsto recibir una inmunización (vacuna). Evite colocarse vacunas atenuadas durante el tratamiento con ICOTYDE.
- si tiene problemas renales.
- si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si ICOTYDE podría dañar al feto.

Estudio de seguridad en el embarazo. Existe un estudio de seguridad en embarazos para las mujeres que reciben ICOTYDE durante el embarazo. El objetivo del estudio es recolectar información sobre la salud de la madre y el bebé. Si está embarazada o queda embarazada durante el tratamiento con ICOTYDE, puede notificar su embarazo llamando al 1-800-526-7736 o visitando www.ICOTYDE.com.

- está amamantando o tiene previsto hacerlo. Se desconoce si ICOTYDE se transfiere a la leche materna. Hable con el proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar al bebé durante el tratamiento con ICOTYDE.

Informe al proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de ICOTYDE?

ICOTYDE puede causar efectos secundarios graves. Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ICOTYDE?”

Los efectos secundarios más comunes de ICOTYDE incluyen los siguientes:

- dolor de cabeza
- náuseas
- tos
- infección fúngica
- cansancio

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ICOTYDE. Llame al médico para pedir asesoría médica sobre los efectos secundarios. **Le recomendamos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA.**

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo tomar ICOTYDE?

- Tome ICOTYDE exactamente como se lo indica su proveedor de atención médica.
- Tome ICOTYDE 1 vez al día cuando se despierte con agua en el estómago vacío. Espere al menos 30 minutos después de tomar ICOTYDE antes de comer.
- Si tiene dificultad para tragar comprimidos, ICOTYDE puede dispersarse en agua. Para obtener más información, lea la Guía del medicamento.
- Si se olvida de tomar una dosis de ICOTYDE, tómela en cuanto se acuerde y vuelva a su horario regular al día siguiente.

Lea la Información completa de prescripción, incluida la Guía del medicamento de ICOTYDE, y analice cualquier duda que tenga con su médico.

cp-575405v1

PREGUNTE A SU MÉDICO SOBRE

 **ICOTYDE™**
(icotrokinra) tablets



Un nuevo tipo de tratamiento en una pastilla de una vez al día

Para adultos y niños de 12 años y mayores, que pesen al menos 40 kg (88 libras), con psoriasis en placas de moderada a grave

La pastilla no representa el tamaño real.

Johnson & Johnson